

『ICD-10』上線實作操作手冊

目 錄

<u>壹、以現行 ICD-9 診斷病名對應轉換『ICD-10』</u>	<u>2</u>
一、使用『ICD-9 轉換 ICD-10』功能視窗	2
二、由『6 診斷資料』進行「ICD-9」轉換「ICD-10」	4
三、由『3 診療作業』進行「ICD-9」轉換「ICD-10」	5
四、現行「ICD-9」編碼沒有出現「ICD-10」對應碼處理方式(一)	6
習慣使用「ICD-9」編碼對應者	6
五、現行「ICD-9」編碼沒有出現「ICD-10」對應碼處理方式(二)	9
使用「ICD-10」病名搜尋功能新增帶入	9
直接輸入「ICD-10」病名碼新增帶入	11
<u>貳、『ICD-10』上線實作操作說明</u>	<u>12</u>
[第 一章]：相關參數說明	12
[第 二章]：診療作業 ICD-10 輸入方式	15
[第 三章]：ICD-9 與 ICD-10 病歷判斷	18
[第 四章]：依側性診斷(一對多)ICD-10 如何選擇修改	20
依據病患病情不同的病歷可選擇不同的 ICD-10 病名碼	20
[第 五章]：如何選擇以中文或英文病名顯示及列印	22
單筆修改方式	22
一次修改方式	23
[第 六章]：系統啓用 ICD-10 相關提示機制	24
<u>參、『ICD-10』醫聖新版修正功能&QA 說明</u>	<u>26</u>

壹、以現行 ICD-9 診斷病名對應轉換『ICD-10』

一、使用『ICD-9 轉換 ICD-10』功能視窗

於主選單畫面上方的功能列點選『D 資料庫』→『診斷病名整理』→『ICD-9 轉換 ICD-10』



➤ 功能按鈕與畫面說明

□ **包含不選用**：勾選後連同不選用的 ICD-9 病名碼也會顯示出來。

□ **只顯示 ICD-10 空白資料**：勾選後只有『ICD-10』對應碼欄位空白的資料會顯示。

重抓資料：上述兩項有設定勾選或不勾選時，按此按鈕重新抓取新設定顯示資料。

更新對應一筆：點選此功能可自動將 ICD-9 可一對一相等對應的 ICD-10 編碼直接帶入。



拷貝：點選右方合適的 ICD-10 病名對應編碼作為左方原 ICD-9 預設申報碼。**新增**：可直接新增右方選擇的 ICD-10 病名。**修改**：可修改滑鼠點選該列的診斷內容。**離開**：關閉此操作視窗。

- 執行『更新對應一筆』功能，屬於相等對應的病名碼會自動對應帶入 ICD-10 欄位內。

選	病名 用 簡稱	原 ICD-9 資料 病名名稱 (英文)	ICD-9	ICD-10	操作模式 拷貝 新增	ICD-10	新 ICD-10 資料 病名名稱 (英文)
<input checked="" type="checkbox"/>			5649	K599	← 拷貝 + 新增	K599	Functional intestinal disorder, unspecified
<input checked="" type="checkbox"/>	*01K	condyloma acuminatum	07811	A630	← 拷貝 + 新增	A630	Anogenital (venereal) warts
<input checked="" type="checkbox"/>	*02K	dmi wo cmp uncntrld	25003	E1065	← 拷貝 + 新增	E1065	Type 1 diabetes mellitus with hyperglycemia
<input checked="" type="checkbox"/>	*07U	Asthma, unspecified, with acute exa	49392	J45901	← 拷貝 + 新增	J45901	Unspecified asthma with [acute] exacerbation
<input checked="" type="checkbox"/>	*099	ulceratve colitis unspcf			← 拷貝 + 新增	K5190	Ulcerative colitis, unspecified, without complications
					← 拷貝 + 新增	K51911	Ulcerative colitis, unspecified with rectal bleeding
					← 拷貝 + 新增	K51912	Ulcerative colitis, unspecified with intestinal obstruction
					← 拷貝 + 新增	913	Ulcerative colitis, unspecified with fistula
					← 拷貝 + 新增	914	Ulcerative colitis, unspecified with abscess
					← 拷貝 + 新增	918	Ulcerative colitis, unspecified with other complication
					← 拷貝 + 新增	919	Ulcerative colitis, unspecified with unspecified complications
<input checked="" type="checkbox"/>	*09C	Other functional disorders of intes			← 拷貝 + 新增	8	Other specified functional intestinal disorders
<input checked="" type="checkbox"/>	*0DL	Lack of normal physiological develo	78340		← 拷貝 + 新增	R6250	Unspecified lack of expected normal physiological development in
					← 拷貝 + 新增	R6259	Other lack of expected normal physiological development in childhc
<input checked="" type="checkbox"/>	*0KK	Observation for abuse and neglect	V7181		← 拷貝 + 新增	Z0471	Encounter for examination and observation following alleged adult p
					← 拷貝 + 新增	Z0472	Encounter for examination and observation following alleged child p
<input checked="" type="checkbox"/>	6918		6918		← 拷貝 + 新增	L200	Besnier's prurigo
					← 拷貝 + 新增	L2081	Atopic neurodermatitis
					← 拷貝 + 新增	L2082	Flexural eczema
					← 拷貝 + 新增	L2083	Infantile [acute] [chronic] eczema

- 屬於一對多(相近對應)的病名碼需由醫師自行選擇，點選右方要對應轉換的 ICD-10 合適編碼後，再按下『拷貝』即會對應帶入至左方 ICD-10 欄位內(申報 ICD-10 的預設編碼)。


選	病名 用 簡稱	原 ICD-9 資料 病名名稱 (英文)	ICD-9	ICD-10	操作模式 拷貝 新增	ICD-10	新 ICD-10 資料 病名名稱 (英文)
<input checked="" type="checkbox"/>			5649	K599	← 拷貝 + 新增	K599	Functional intestinal disorder, unspecified
<input checked="" type="checkbox"/>	*01K	condyloma acuminatum	07811	A630	← 拷貝 + 新增	A630	Anogenital (venereal) warts
<input checked="" type="checkbox"/>	*02K	dmi wo cmp uncntrld	25003	E1065	← 拷貝 + 新增	E1065	Type 1 diabetes mellitus with hyperglycemia
<input checked="" type="checkbox"/>	*07U	Asthma, unspecified, with acute exa	49392	J45901	← 拷貝 + 新增	J45901	Unspecified asthma with [acute] exacerbation
<input checked="" type="checkbox"/>	*099	ulceratve colitis unspcf	5649	K5190	← 拷貝 + 新增	K5190	Ulcerative colitis, unspecified, without complications
					← 拷貝 + 新增	K51911	Ulcerative colitis, unspecified with rectal bleeding
					← 拷貝 + 新增	K51912	Ulcerative colitis, unspecified with intestinal obstruction
					← 拷貝 + 新增	K51913	Ulcerative colitis, unspecified with fistula
					← 拷貝 + 新增	K51914	Ulcerative colitis, unspecified with abscess
					← 拷貝 + 新增	K51918	Ulcerative colitis, unspecified with other complication
					← 拷貝 + 新增	K51919	Ulcerative colitis, unspecified with unspecified complications
<input checked="" type="checkbox"/>	*09C	Other functional disorders of intes	56489	K598	← 拷貝 + 新增	K598	Other specified functional intestinal disorders
<input checked="" type="checkbox"/>	*0DL	Lack of normal physiological develo	78340		← 拷貝 + 新增	R6250	Unspecified lack of expected normal physiological development in
					← 拷貝 + 新增	R6259	Other lack of expected normal physiological development in childhc
<input checked="" type="checkbox"/>	*0KK	Observation for abuse and neglect	V7181		← 拷貝 + 新增	Z0471	Encounter for examination and observation following alleged adult p
					← 拷貝 + 新增	Z0472	Encounter for examination and observation following alleged child p
<input checked="" type="checkbox"/>	6918		6918		← 拷貝 + 新增	L200	Besnier's prurigo
					← 拷貝 + 新增	L2081	Atopic neurodermatitis
					← 拷貝 + 新增	L2082	Flexural eczema
					← 拷貝 + 新增	L2083	Infantile [acute] [chronic] eczema

- 有關對應資料檔案可上本公司網站下載健保署提供「ICD-9-CM 2001 年版與 ICD-10-CM 對應資料閱讀說明」、「ICD-9-CM2001 年版與 ICD-10-CM 對應資料檔」參閱。


二、由『6 診斷資料』進行「ICD-9」轉換「ICD-10」

於『6 診斷資料』畫面如下圖紅框線處，①點選不同的 ICD9 代碼時，下方會顯示對應的 ICD-10 相關代碼資料，醫師可於畫面下方點選合適的對應碼②（反黃列），再按下③『複製 ICD-10 至 DATA』功能鈕，即可將該代碼對應至④『ICD-10』欄位內。

注意！正式實施以 ICD-10 申報完成後，不建議任意修改已完成對應之 ICD-10 病名代碼，否則已申報過的歷史病歷資料 ICD-10 碼會一併變更為新對應碼，若有需要請以新增病名方式！



➢ 用滑鼠左鍵點一下『ICD-10 英文名稱』標題列可切換為『ICD-10 中文名稱』顯示



➢ 再滑鼠左鍵點一下『ICD-10 中文名稱』標題列可再切換回『ICD-10 英文名稱』顯示



三、由『3診療作業』進行「ICD-9」轉換「ICD-10」

於所鍵入的『ICD-9』欄位，例如：25000 診斷碼上快速點擊滑鼠左鍵二下

ICD-9	高雄市三民區德北街1號 073154932	icd10
25000	糖尿病	

開啓診斷資料修編畫面，於右下角↓ICD-9 對應 ICD-10 相關資料↓區可以查看符合該 ICD9 可對應 ICD-10 的相關資料，點選要轉換代碼後按下『複製 ICD-10 至 DATA』即可更新。

病名	Acode	名稱(英)
Z027	A181	糖尿病
Z028	A341	十二指腸潰瘍
Z029	A464	上腹痛
Z02A	A225	癲癇
Z02B	A260	高血壓性心臟病
Z02C	A269	高血壓疾病
Z02D	A180	甲狀腺功能亢進
Z02E	A249	美尼爾氏病
Z02F	A319	過敏性鼻炎
Z02G	A180	甲狀腺功能過低
Z02H	A429	接觸性皮炎
Z02I	A325	慢性阻塞性肺疾病
Z02J	A330	牙齦炎
Z02K	A359	尿道炎
Z02L	A439	板機指

ICD-9	25000	A-CODE	A181
ICD-10		特診代號	04
醫師群組		選用	Y

ICD-10	ICD-10 英文名稱
E119	Type 2 diabetes mellitus without complications 第二型
E139	Other specified diabetes mellitus without complication: 其他特


↓完成對應編碼資料會顯示在右方『ICD-10』欄位，即為 ICD-10 預設申報病名碼

ICD-9	高雄市三民區德北街1號 073154932	icd10
25000	糖尿病	E119 Y

注意！正式實施以 ICD-10 申報完成後，不建議任意修改已完成對應之預設 ICD-10 申報病名代碼，否則已申報過的歷史病歷資料 ICD-10 碼會一併變更為新對應碼！

四、現行「ICD-9」編碼沒有出現「ICD-10」對應碼處理方式(一)

- **習慣使用「ICD-9」編碼對應者** 舉例說明：腹痛病名碼為『789.0』
【因費用申報格式「小數點」免填，因此醫聖軟體操作時只需輸入 7890 即可】



在「↓ICD-9 對應 ICD-10 相關資料↓」欄位內無任何對應內容，表示此病名碼有可能為粗碼 (ICD-10 為無效碼)，需使用 ICD-9 細碼對應 ICD-10 才有資料。

院所可至本公司網站下載『ICD-9-CM2001 年版與 ICD-10-CM 對應資料檔.xls』開啓查閱。

	A	B	C	D	E	F
1	ICD-9-CM代碼	ICD-9-CM英文名稱	ICD-9-CM中文名稱	ICD-10-CM	ICD-10-CM英文名稱	ICD-10-CM中文名稱
32216	789.00	Abdominal pain, unspecified site	腹痛	R10.83	Colic	腹絞痛
32217	789.00	Abdominal pain, unspecified site	腹痛	R10.9	Unspecified abdominal pain	腹痛
32218	789.01	Abdominal pain, right upper quadrant	腹痛，右上四分之一	R10.11	Right upper quadrant pain	右上四分之一腹痛
32219	789.01	Abdominal pain, right upper quadrant	腹痛，右上四分之一	R10.83	Colic	腹絞痛
32220	789.02	Abdominal pain, left upper quadrant	腹痛，左上四分之一	R10.12	Left upper quadrant pain	左上四分之一腹痛
32221	789.02	Abdominal pain, left upper quadrant	腹痛，左上四分之一	R10.83	Colic	腹絞痛
32222	789.03	Abdominal pain, right lower quadrant	腹痛，右下四分之一	R10.31	Right lower quadrant pain	右下四分之一腹痛
32223	789.03	Abdominal pain, right lower quadrant	腹痛，右下四分之一	R10.83	Colic	腹絞痛
32224	789.04	Abdominal pain, left lower quadrant	腹痛，左下四分之一	R10.32	Left lower quadrant pain	左下四分之一腹痛
32225	789.04	Abdominal pain, left lower quadrant	腹痛，左下四分之一	R10.83	Colic	腹絞痛
32226	789.05	Abdominal pain, periumbilic	臍周圍痛	R10.33	Periumbilical pain	臍周圍痛
32227	789.05	Abdominal pain, periumbilic	臍周圍痛	R10.83	Colic	腹絞痛
32228	789.06	Abdominal pain, epigastric	上腹痛	R10.13	Epigastric pain	心窩部痛
32229	789.06	Abdominal pain, epigastric	上腹痛	R10.83	Colic	腹絞痛
32230	789.07	Abdominal pain, generalized	全腹痛	R10.83	Colic	腹絞痛
32231	789.07	Abdominal pain, generalized	全腹痛	R10.84	Generalized abdominal pain	全腹痛

在右側尋找適合申報的 ICD-10 編碼如「R10.9」，再往其左側查看對應的 ICD-9 編碼為「789.00」，然後再進行新增對應作業。軟體操作說明如下：


進入『6 診斷資料』，滑鼠左鍵按下「ICD-9」欄位名稱，在「請輸入您所需的搜索鍵值」視窗輸入「7890」再按下「Ok」



找到該筆資料後按下『修改 F3』，將選用改為「N」，再按下『存檔 F9』



接著按下『新增 F2』，於「A-Code：」欄輸入「7890」或直接輸入「78900」，於下方清單點選要加入的病名，再按下『加入選項』，選擇完畢後，再按下『新增加入』



新增完成的 ICD-9 病名碼再進行 ICD-10 編碼對應轉換作業即可。



五、現行「ICD-9」編碼沒有出現「ICD-10」對應碼處理方式(二)

➤ 使用「ICD-10」病名搜尋功能新增帶入

直接輸入中、英文病名關鍵字，再按下「ENTER」鍵進行搜尋

ICD-9		高雄市三民區德北街1號 073154932	icd10
	腹痛		

主訴搜尋
 體重 0.0 KG
 體溫 0.0 °C
 血壓 0/ 0
 LMP 1/2

搜尋視窗上方腹痛「ICD-9」病名碼『7890』編碼下方沒有「ICD-10」對應碼

慢性	ICD-9	ICD-10	國際傷病名稱(英)	國際傷病名稱(中)	病名代碼	A Code	型態
	64893		pregnancyweeks and acute abdomen.	妊娠合併急性腹痛	G767	6489	妊娠
	7890		腹痛	腹痛	J683	7890	不可
	7890		abdominal pain (infantile colic)	腹痛(嬰兒腹絞痛)	J684	7890	不可
	7890		lower abdominal pain	下腹痛	J685	7890	不可


【找到筆數:4】 搜尋 By ICD-9 資料庫 確定 離開

病名搜尋視窗預設勾選「病名查詢使用舊版 ICD-9」，請取消勾選後，再點選「重抓資料」


請選擇國際傷病名稱(條件式: "腹痛" Sick_Name1)	
過濾條件: 腹痛	<input checked="" type="radio"/> By 病名 <input type="radio"/> By ICD-9 <input type="radio"/> By ICD-10 <input type="checkbox"/> 病名查詢使用舊版ICD-9 <input type="button" value="重抓資料"/>
慢性	ICD-9 ICD-10 國際傷病名稱(英)

系統會重新以 ICD-10 病名進行關鍵字符符合病名搜尋

請於搜尋結果完成視窗點選合適的 ICD-10 病名碼後，雙擊滑鼠左鍵或按下「確定」帶入



出現如圖視窗詢問是否加入選用病名，請點選使用中文或英文顯示或列印病名，按下「確定」



病名選用新增帶入完成

醫聖 醫院院所作業系統 (HIS 64bit) 版 ★ 6.0185 - December 25 2015 (醫聖模範診所)-FWHX 10.12
 病歷:007612 金富貴(男) 生日:68.09.21 年齡:036.03.06 ID:A123456789 看診日:104.12.26/1 序號:1 家:D1(部:D10) 卡:B000

F2掛號清單 F3診療作業(No. 26)(平均0.00項) F4歷史病歷 F5過敏/檢查/醫囑/提醒 F6放射科檢查

主訴搜尋
 體重 0.0 KG
 體溫 0.0 °C
 血壓 0/ 0
 LMP

ICD-9 高雄市三民區德北街1號 073154932 icd10
 78900 腹痛 R109

處置名稱	數量	途徑用法	天	總量註	標(刪)
	0.00			0	

S 自定名稱 簡稱
 R004 其他非屬R001~R00 R004
 Tramezin tablets "ho 101704
 Sinflo f.c.tab. 200m AB
 Piprinhydrinate tabl 101702
 Cimwei tablets 200m 101703
 Bloodnone capsules 2 101701
 42006C簡單治療-中度 42006
 48018C皮面創傷換藥(4801
 R001因藥品遺失等原因 R001
 Rosiglit f.c. tablet 25000
 Diphenidol sugar coa DIP
 Tetanus toxoid alum TET
 Anna f coated tablet AF
 Cardiol tablets 25mg CARV
 Tetanus toxoid alum TO
 Callate tablets "yun CAL
 Tonlief f.c. tablets TONL
 5% sal-bron injectio SAB
 Ferall soft capsules FE
 Diabecon f.c. tablet DIA
 Tramacet f.c. tablet TRA
 Valazyd 160 tablets VALA
 Landuet tablets 10mg LAND

命列: 複診 金富貴 年齡:036.03.06 過敏:無 時間:11:14:38
 加入病歷 清除點選 處置 1.顆粒

如果你已經選定了項目,你可以按下滑鼠右鍵調出清單查看!!

主訴搜尋
 體重 0.0 KG
 體溫 0.0 °C
 血壓 0/ 0
 LMP

ICD-9 高雄市三民區德北街1號 073154932 icd10
 78900 腹痛 R109

檢驗

➤ 直接輸入「ICD-10」病名碼新增帶入

配合系統參數設定：主畫面按『B 院所資料』再按右下方『其他參數』點選上方『DOCTOR [B]』選擇下方編號『B140』「病名查詢先抓取 ICD-10 碼」將設定值改為『Y』。於診療作業病名區「ICD-9」欄內直接輸入 ICD-10 病名代碼，如「R109」即可新增。

貳、『ICD-10』上線實作操作說明


[第一章]：相關參數說明

主畫面按『B 院所資料』再按右下方『其他參數』查看下列參數設定


- 1、點選上方『OTHER [H]』選擇下方編號『H190』『啟用ICD-10申報基準年月(YYYYMM)』該參數值預設為「10501」。【此參數請依據健保署公告正式實施基準日修正即可】
- 2、點選上方『DOCTOR [B]』選擇下方編號『B138』『只有一筆時出選單』設定『N』時診療作業輸入病名不會出現選單讓醫師逐筆挑選 ICD-10 碼。設定『Y』時診療作業輸入病名會逐筆出現 ICD-10 相關選擇視窗
- 3、點選上方『DOCTOR [B]』選擇下方編號『B135』『病名查詢使用舊版 ICD-9』設定『N』時診療作業輸入病名搜尋選單以 ICD-10 碼為主。設定『Y』時診療作業輸入病名搜尋選單以原選用 ICD-9 碼為主。
- 4、點選上方『DOCTOR [B]』選擇下方編號『B140』『病名查詢先抓取 ICD-10 碼』設定『N』時診療作業無法直接輸入 ICD-10 病名代碼。設定『Y』時診療作業可直接輸入 ICD-10 病名代碼，如「R109」。

參數修改：1、按「B 院所資料」






點選右下方『其他參數』



點選上方『OTHER [H]』選擇下方編號『H190』啟用 ICD-10 申報基準年月(YYMM)，該參數值預設為 10501。




點選上方『DOCTOR[B]』選擇下方編號『B138』只有一筆時出選單

- 1、設定『N』時診療作業輸入病名不會出現選單讓醫師逐筆挑選 ICD10 碼
- 2、設定『Y』時診療作業輸入病名會逐筆出現 ICD10 相關選擇視窗

編號『B135』「病名查詢使用舊版 ICD-9」

設定『N』時診療作業輸入病名搜尋選單以 ICD-10 碼為主。

設定『Y』時診療作業輸入病名搜尋選單以原選用 ICD-9 碼為主。




編號『B140』「病名查詢先抓取 ICD-10 碼」

設定『N』時診療作業無法直接輸入 ICD-10 病名代碼


設定『Y』時診療作業可直接輸入 ICD-10 病名代碼，如「R109」

[第二章]：診療作業 ICD-10 輸入方式

輸入原 ICD-9 碼或是 ICD-10 碼




診斷會先帶出預設 ICD10 碼與中英名稱說明 (內容空白表示尚未對應)
若要變更當次診斷資料或是預設 i c d 1 0 , 請於 icd10 欄位按鍵盤
『Ctrl』+『Enter』或雙擊滑鼠左鍵。






下方會列出原 ICD-9 相對應的 ICD-10 內容，雙擊滑鼠左鍵兩下即可選擇帶入，當次相符合診斷資料。




點選名稱中(英)文 右方的『顯示』『列印』字樣 前方小圓框，使其設定為 顯示 與 列印 名稱方式



設定完成後按下『存檔 F9』再按下『是』即可。

若要查看原 ICD-9 碼名稱資料，請按鍵盤『→』鍵，此時右方會顯示『國際傷病名稱 2』為原 ICD-9 名稱。
註：設定啟用基準年月前則會顯示 ICD-10 名稱




[第 三章]：ICD-9 與 ICD-10 病歷判斷

1、診療作業歷史病歷畫面判斷

- (1)ICD-10 開始實施後於歷史病歷顯示原 ICD-9 與 ICD-10 碼
- (2)ICD-10 未實施前於歷史病歷顯示原 ICD-9 與病名簡稱資料


診療作業歷史病歷顯示方式：

1、ICD10 開始實施後於歷史病歷顯示原 ICD9 與 ICD10 碼



診療作業歷史病歷顯示方式：


2、ICD10 未實施前於歷史病歷顯示原 ICD9 與病名簡稱資料。




2、調閱病歷畫面判斷

- (1) ICD-10 開始實施後於歷史病歷顯示原 ICD-9 與 ICD-10 碼
- (2) ICD-10 未實施前於歷史病歷顯示原 ICD-9 與病名簡稱資料。

調閱病歷顯示方式：
1、ICD10 開始實施後於歷史病歷顯示原 ICD9 與 ICD10 病名碼



調閱病歷顯示方式：
2、ICD10 未實施前於歷史病歷顯示原 ICD9 病名碼



[第 四章]：依側性診斷(一對多)ICD-10 如何選擇修改

依據病患病情不同的病歷可選擇不同的 icd-10 病名碼

請於『icd-10』欄位按鍵盤『Ctrl』+『Enter』或雙擊滑鼠左鍵，開啓病名選擇視窗

ICD-9 高雄市三民區德北街1號 073154932 icd10			<input checked="" type="checkbox"/> 主訴搜尋
80501	第一頸椎移位閉鎖性骨折之初期照護	S1200	體重 0.0 KG 體溫 0.0 °C 血壓 0/ 0 LMP 1/2

下方會列出原 ICD-9 相對應的 ICD-10 內容，點選合適編碼後雙擊滑鼠左鍵兩下或按下「確定」即可選擇帶入，當次相符合診斷資料。系統並會自動新增該筆病名。

請選擇國際傷病名稱(條件式)

過濾條件: 80501 By 病名 By ICD-9 By ICD-10 病名查詢使用舊版ICD-9 重抓資料

標性	ICD-9	ICD-10	國際傷病名稱(英)	國際傷病名稱(中)	病名代碼	A Code	型態
	80501	S12000A	tx c1 vertebra-closed	第一頸椎閉鎖性骨折	K203	80501	損傷
	80501	S12000A	Unspecified displaced fracture of first cervical vertebra	第一頸椎移位閉鎖性骨折之初期照護			
	80501	S12001A	Unspecified nondisplaced fracture of first cervical vertebra	第一頸椎非移位閉鎖性骨折之初期照護			
	80501	S1201XA	Stable burst fracture of first cervical vertebra	第一頸椎穩定爆裂閉鎖性骨折之初期照護			
	80501	S1202XA	Unstable burst fracture of first cervical vertebra	第一頸椎不穩定爆裂閉鎖性骨折之初期照護			
	80501	S12030A	Displaced posterior arch fracture of first cervical vertebra	第一頸椎後弓移位閉鎖性骨折之初期照護			

F3 診療作業畫面內 icd10 欄位病名碼已異動完成。

ICD-9 高雄市三民區德北街1號 073154932 icd10			<input checked="" type="checkbox"/> 主訴搜尋
80501	第一頸椎穩定爆裂閉鎖性骨折之初期照護	S1201	體重 0.0 KG 體溫 0.0 °C 血壓 0/ 0 LMP 1/2

若為一對多診斷病名資料時，輸入病名或病名碼時，會由「icd-10」欄位新增過的病名會自動列出清單供醫師挑選，請醫師於上方選擇合適代碼即可。若上方找不到合適代碼時，再於下方相對應資料區點選合適代碼，系統會再自動新增一筆。

醫學 醫院院所作業系統 (請選擇國際傷病名稱(條件式))

病歷-007612 金富貴(男)

F2掛號清單

過濾條件: By 病名 By ICD-9 By ICD-10 病名查詢使用舊版ICD-9

慢性	ICD-9	ICD-10	國際傷病名稱(英)	國際傷病名稱(中)	病名代碼	A Code	型態
是	25000	E139	dmii wo cmp nt st uncntr	第二型或未明示型糖尿病，未提及併發	1002	25000	內科
是	25000	E119	糖尿病	糖尿病	C281	25000	內科

ICD-9 高雄市三
25000

處置名稱

慢性	ICD-9	ICD-10	國際傷病名稱(英)	國際傷病名稱(中)
是	25000	E119	Type 2 diabetes mellitus without complication	第二型糖尿病，未伴有併發症
是	25000	E139	Other specified diabetes mellitus without com	其他特定糖尿病，未伴有併發症

命列
複診

X F7

【找到筆數:2】搜尋 By ICD-9 資料庫

[第五章]：如何選擇以中文或英文病名顯示及列印

➤ 單筆修改方式

請於『ICD-9』欄位按鍵盤『Ctrl』+『Enter』或雙擊滑鼠左鍵，開啓病名編輯視窗

			<input checked="" type="checkbox"/> 主訴搜尋
			體重 0.0 KG
			體溫 0.0 °C
			血壓 0/ 0
			LMP 1/2
<input type="button" value="檢驗"/>			

ICD-9	高雄市三民區德北街1號 073154932	icd10
25000	第二型糖尿病，未伴有併發症	E119

於「名稱[英]」或「名稱[中]」病名列右方 顯示 列印 項目點選即可

英文名稱：Other specified diabetes mellitus without complications(其他特定糖尿病，未伴有併發症)

診斷簡稱	C281
名稱[英]	<input type="radio"/> 顯示A <input type="radio"/> 列印B
糖尿病	
名稱[中]	<input checked="" type="radio"/> 顯示C <input checked="" type="radio"/> 列印D
糖尿病	
ICD-10名稱	
其他特定糖尿病，未伴有併發症	

ICD-9	25000	A-CODE	25000
ICD-10	E139	特診代號	01
醫師群組		選用	Y
自定分類	內分泌腺		
批價科別			
常用排序	9999	類別排序	0.0

選項式快速新增

病名簡	Acode	名稱[英]
C281	25000	糖尿病
C282	25000	diabetes mellitus (dm)
C283	25000	diabetes mellitus , type ii
C284	25000	diabetes mellitus(no complication)
C285	25001	dmi wo cmp nt st unctrl
C286	25001	diabetes mellitus, insulin dependen
C289	25010	dmii keto nt st unctrlrd
C290	25011	Type 1 diabetes mellitus with ketoa
C293	25020	dmii hprsm nt st unctrl
C294	25021	dmi hprsm nt st unctrlrd
C297	25030	dmii o cm nt st unctrlrd
C298	25031	dmi o cm nt st unctrlrd
C301	25040	dmii renal nt st unctrlrd
C302	25040	diabetes mellitus with nephropathy
C303	25040	diabetic nephropathy

↓ ICD-9 對應 ICD-10 相關資料 ↓

ICD-10	ICD-10 英文名稱	
E119	Type 2 diabetes mellitus without complications	第二型
E139	Other specified diabetes mellitus without complications	其他特

新增 F2 修改 F3 篩選 F4 刪除 F5 查詢 F8 禁忌藥品 存檔 F9 列印 Esc

➤ 一次修改方式

於醫聖門診系統主畫面按下『D 資料庫』→『診斷病名整理』→『病名資料一次轉作業』



請依院所需求點選 要以中文或英文病名顯示 或 要以中文或英文病名列印
按下「確定」即完成設定。



○顯示 設定說明：診療作業病名區會依院所設定統一以中文或英文病名顯示

ICD-9	高雄市三民區德北街1號 073154932	icd10	LMP	12
25000	第二型糖尿病，未伴有併發症	E119		

○列印 設定說明：病歷處方會依院所設定統一以中文或英文病名列印


：金富貴(男)A123456789生日68.09.21(36.03)0.0Kg
<105.01.01;1>科別:01案件:04卡號:A000健 服法:顆粒
醫師:李慶成 藥師:

E119 第二型糖尿病，未伴有併發症

[第 六章]：系統啓用 ICD-10 相關提示機制

說明：於參數設定啓用 ICD-10 申報基準設定年月以前，所有病歷處方列印會以 ICD-9 病名資料為主，於啓用基準年月以後，會以完成對應或自定選擇的 ICD-10 病名資料為主。

➤ 尚未選擇 ICD-10 病名碼時，會出現如下圖提醒視窗



批價存檔時，會出現如下圖選擇 ICD-10 病名碼視窗，於右方 ICD-10 資料區選擇合適編碼後按下「拷貝」或於選定的病名碼(粉框區)如「E119」上雙擊滑鼠左鍵即可直接帶入該資料。



- 於『9 費用申報』第4項製作申報磁片的C檢查錯誤時，若無ICD-10病名碼時，也會出現如上圖『選擇ICD-10病名碼視窗』，請修正完畢再進行申報作業，以免檢核錯誤。



參、「ICD-10」醫聖新版修正功能&QA 說明

Q：請問 105 年 1 月 1 日起「ICD-10」正式上線門診系統符合規定使用版本

A：請務必更新醫聖門診系統版本至 6.0189 以上。

修正說明：此版次之前的用戶，更新版本後需再至每日上傳畫面，選擇 105.01.01 起始日至應補正上傳之迄日(更新此版日)為止，按下「IC 上傳」再重新補正上傳。此版次之後用戶正常作業即可。

Q：「ICD-10」英文病名太長，導致處方印到右邊頁，可否修正依長度自動跳行功能

A：請更新醫聖門診系統版本至 6.0193 January-07 以上即可。

Q：交付檢驗單未列印「ICD-10」病名碼如何處理

A：請更新醫聖門診系統版本至 6.0198 January-12 以上即可。

Q：原使用「ICD-9」病名沒有出現對應碼或對應病名碼不是醫師需要的病名碼時，可否由院所自行修改輸入合適對應的「ICD-10」預設病名碼

A：此自定功能目前僅限醫聖專業人員帳密登入方可修改。若院所有上述需求勞煩電洽醫聖客服專員連線為您處理！【請更新門診系統版本至 6.0198 January-12 以上】

➤ 原「ICD-9」病名沒有對應的「ICD-10」

ICD-9 280 A-CODE 280
ICD-10 D509 特診代號
醫師群組 選用
自定分類

ICD-10 名稱
重大創傷且其嚴重程度到達創傷嚴重程度分數十六以上

ICD-9 95999 A-CODE 95999
ICD-10 T07 特診代號
醫師群組 選用 Y

↓ ICD-9 對應 ICD-10 相關資料 ↓ 複製ICD-10碼至DATA

ICD-10	ICD-10 英文名稱
9595	9595 finger injury nos
9596	9596 hip & thigh injury nos
9597	9597 lower leg injury nos
95999	9598 injury mlt site/site nec

↓ ICD-9 對應 ICD-10 相關資料 ↓ 複製ICD-10碼至DATA

ICD-10	ICD-10 英文名稱
K660	Peritoneal adhesions (postprocedural) [postinfection]
N994	Postprocedural pelvic peritoneal adhesions

➤ 原「ICD-9」病名對應健保署公告給予的「ICD-10」覺得不合適要填入自定選擇碼

ICD-10 名稱
其他特定腹膜疾患

ICD-9 5680 A-CODE 5680
ICD-10 K668 特診代號
醫師群組 選用 Y

↓ ICD-9 對應 ICD-10 相關資料 ↓ 複製ICD-10碼至DATA


ICD-10	ICD-10 英文名稱
5678	5678 suppurat peritonitis nec
5678	5678 peritonitis nec
5679	5679 peritonitis nos
5679	5679 peritonitis
5680	5680 peritoneal adhesions

ICD-10	ICD-10 英文名稱
K660	Peritoneal adhesions (postprocedural) [postinfection]
N994	Postprocedural pelvic peritoneal adhesions

Q：「ICD-10」病名名稱可否自行修改

A：請更新醫聖門診系統版本至 6.0193 January-07 以上。


操作說明：診斷資料病名編輯畫面的「ICD-10 名稱」病名欄位最右方新增「ICD-10」病名中英文編輯功能，滑鼠左鍵按下圖示(粉框處)即可開啓編輯系統，編輯完成按下「存檔」即可。



Q：「病名資料列印與顯示一次轉作業」視窗是否可以不再顯示

A：請更新醫聖門診系統版本至 6.0197 January-11 以上。


操作說明：於診療作業新增病名時，若不要再顯示如下圖設定選擇視窗畫面，勾選 「新增一筆 ICD-10 資料時不再顯示本視窗」再按下「確定」即可。



Q：看診及抽審列印的「中英文病名」可否以診所原本的「ICD9 中英文病名」為主

A：請更新醫聖門診系統版本至 6.0201 January-15 以上。

操作說明：在主選單畫面的上方的「資料庫」=>「診斷病名整理」=>「病名資料一次轉作業」畫面中，勾選 「病名顯示與列印名稱沿用原 ICD-9 名稱」按下「確定」即完成變更。



說明：現行版本看診畫面病名區預設中英文名稱爲 ICD-10，『國際傷病名稱 2』欄爲原 ICD-9 中英文名稱。改選 「病名顯示與列印名稱沿用原 ICD-9 名稱」功能後，看診畫面顯示如下

●預設病名名稱變成 ICD-9 為主 (未異動前爲 ICD-10 病名)

ICD-9	高雄市三民區德北街1號 3154932	icd10	
4019	本態性高血壓	I10	Y

●國際傷病名稱 2 病名名稱變成 ICD-10 (未異動前爲 ICD-9 病名)

ICD-9	icd10	國際傷病名稱2
4019	I10	Y 本態性(原發性)高血壓

按鍵盤向右鍵往右移可查看非預設的病名名稱

異動說明：病名碼的顯示及列印以 ICD-10 為主，但病歷處方、抽審醫令清單、歷史病歷相關病名名稱顯示及列印內容則會改以診所原本的「ICD9 中英文病名」為主。



TEL : (07) 315-4932 ; 315-4871 FAX : (07) 315-4827

TEL : (02) 8972-5837 FAX : (02) 8972-5841

手機服務專線 : 0939-373262 ; 0982-218581 ; 0982-218876

Internet 網址 <http://sc-dr.tw>

VPN 網址 <http://10.252.3.82>

若有任何操作或使用上的問題，請電洽醫聖客服專員為您服務！